



Özet

Birçok kültür hymen'in yırtılmasının ilk cinsel ilişkide ağrıya neden olduğunu inanmıştır. Bazı kültürler, evlendiği zaman kadının bakire olmasında ısrarcıdır. Bu yanlış inanç tıbbi muayenede uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu muayene kadının kendi vücudu üzerindeki hakkını ortadan kaldırır ve kadınlarda bazı sorunlara yol açar. Kadınlar için ilk cinsel ilişki bakire olup olmadığının test edilmesi anlamına gelir. Bu kadınlar, kadınların bir sonraki nesliyle düğün gecesi korkusunu paylaşır. Böylece genç kadınların korkularını oluşturur, yerleştirir ve yeniden üretirler. Hymen çok farklı yapılarda olabilir. Bu membran vajinayı tamamen kaplıyorsa, kadın ilk âdet zamanı bilemeyecektir. Bazı kadınlarda, bu doku bulunmaz, böylece ilk ilişki sırasında kanama ve yırtılma olmaz. Hymen kontrolü rutin ya da sağlık sorunlarına bağlı olarak tıbbi muayenenin bir parçası değildir. Doktorlar hymen kontrolü ve onarımı talebini reddetme hakkına sahiptir. Cinsel saldırı sonrası gelen adli vakalar hariç hymen kontrolü talepleri reddedilmeli ve genital muayene bulguları rapor edilmemelidir. Kadınların kendi iradesiyle hymen kontrolü veya onarımı talebinde bulunmalarında, hekimin etik sorumlulukları talep konusunda kadınların bilgilendirilmesi ve işlemin reddedilmesidir. Ancak birçok doktor hymen onarım talep eden hastalara işlemde bulunmaktadır. Biz bu onarım sürecinin kadınların evlendiği zaman bakire olması gerektiği düşüncesine katkıda bulunacağını inanıyoruz. Eğitim programlarının düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kabahatli Sayılma; Hymen; Bakirelik

Abstract

Many cultures have believed that tearing the hymen caused pain on first intercourse. Some cultures have insisted on female virginity when she married. This false belief has been used for many years in the medical examination. This examination eliminates to woman's right on her own body and leads to some problems in women. First sexual intercourse for women means that the fear of testing whether or not virgin. These women share fear of wedding night with the next generation of women. Thus they create, places and reproduces fears of young women. The hymen can have many different configurations. If this membrane completely covered the vagina, the woman would know by the time she first menstruated. In some women, this tissue is not found, thus bleeding and torn does not occur during first intercourse. Hymen control is not a part of medical examination depending on the routine or health problems. Physicians has right to refuse to demands of hymen control and its repair. Except the forensic cases admitted after sexual assault, demands of hymen control should be returned and genital examination results should not be reported. In case of the women can request hymen control or its repair at their own volition, physician's ethical responsibilities are informing women about demand and rejecting the transaction. However many physicians operate on patients who request hymen repair. We believe that this repair process would contribute to the belief that women must a virgin when she married. Arranging training programs is of great importance.

Keywords

Blameworthy; Hymen; Virginity

Giriş

Dişi yenidoğanlarda ostium vagina'yı çevreleyen bir zar (hymen) vardır [1]. Ergenlik dönemine kadar dış dünyadan kaynaklanabilecek olan hastalıklara karşı korur [2]. Bu zarlar genellikle merkezinde bir açıklığa sahiptir. Çocukluk sırasında bazı hymen dokusu yürüyüş, spor, yıkanma, bedenini keşfetme ve mastürbasyon yüzünden hasara uğrar [3]. Bazı aileler genellikle cinsel eğitim vermekten imtina veya ihmal edebilir. Ailelerin bu tutumu mastürbasyon sırasında hymene ait dokunun hasarının nedenlerinden biri olabilir [4]. Hymen, bazen kadınlar evlendiğinde ve muhtemelen ilk kez cinsel ilişkiye girdiğinde de delinebilir. Bazı kadınlarda hymen, ostium vagina'yı tamamen kapatmıştır. Eğer daha önce muayene esnasında fark edilmemişse bu kadın ilk âdet zamanına kadar bu durumu bilemez. Imperfore (delik olmayan tamamen kapalı) hymen'e sahip böyle kadınlar, vücutlarının içinde fizyolojik olarak meydana gelen ilk regl (menstrüasyon) ile birlikte genellikle şiddetli ağrı duyarlar. Ancak bu kızlar regl olamazlar yani vücutlarının içindekileri dışarıya atamazlar ve erken yaşlarda hymenectomy (hymen'in kesilerek çıkarılması) olması gerekir. Bazı kadınlarda ise, bu doku yoktur, böylece ilk ilişki sırasında kanama ve yırtık ortaya çıkmaz [3,5,6]. Buna ek olarak, kanamanın nedeni her zaman hymen değildir. Kanama, cinsel ilişki sırasında zarar görmüş diğer dış genital nedeniyle de olabilir [3]. Hymen'in elastik özelliği veya cinsel ilişki sırasında fizyolojik olarak salgılanan sıvılar, hymen'de hasar olmadan cinsel ilişkinin tamamlanmasına olanak sağlar. Bu durumda ortaya çıkan küçük yırtıklar genellikle kanamaya neden olmaz. Eğer yırtık sıgı ise, hymen herhangi bir iz kalmaksızın iyileşir [7].


Yanlış İnanış

Birçok kültür hymen'in ilk ilişkide yırtılmasının kadına ağrı veren bir deneyim olduğuna inanmıştır. Bu yanlış inanın hala geçerli olduğu söylenebilir. Bu kültürler evlilik olduğu zaman kadında bekaret konusunda ısrarlıdır [8-12]. Evlilik gerçekleşikten ve ilk cinsel ilişkiye girildikten sonra çarşafıta kan bulunmaması durumunda gelinin ailesi şerefsizlikle suçlanabilir. Yapılan bu evlilik merasimi ve süreci esnasında başlık parası gibi diğer yanlış gelenekler de uygulanmışsa bu aileye dolandırıcılık suçlamaları yüklenebilir. Bu yanlış inanç nedeniyle kadınlar için ilk cinsel ilişki bakire olup olmadığının test edilmesi anlamına gelir. Birçok gelinin masum olduğu halde çok büyük bir risk alacağı ve böyle bir suçlama olursa hiçbir şansı kalmadığı düşüncesi kadınlar arasında konuşulabilir. Bu kadınlar, bir sonraki kadın nesliyle düğün gecesi korkusunu paylaşır. Onlara el değmemiş ve değerli olma fikrini de aktarır. Böylece genç kadınların korkularını oluşturur, yerleştirir ve yeniden üretirler. Genellikle annelerinin yönlendirmesi ile, birçok gelin çarşafıta kan lekesi oluşturmak ve onların düğün gecesi geleneğine uymak için yeterli kan üreten, keskin bir aletle uyluğun iç tarafında bir bölgede kendilerini kesebilir. Buna ek olarak, bazı kültürler genç bir kadının bekareti hakkında şüphe ve sorular ortaya çıktığında, genç kadının bakire olup olmadığını belirlemek için bir muayenenin yapılabileceğine inanıyordu. Bu yanlış inanış nedeniyle tıp bilimi, tıbbi muayenelerde hymen muayenesini (mayubiyet) uzun yıllardır kullanmaktadır [13]. Kusurlu olma (kabahatli sayılma) kavramının kanunlardan çıkarılması sonucunda, cinsel saldırı için yapılacak muayenelerde tek ölçütün hymen olarak değerlendirilmesinin önüne geçilmiştir. Hymen kontrol muayenesi erkek egemen kültürlerde kadınlar üzerinde önemli bir yaptırım aracıdır. Bu muayene, kadının kendi vücudu üzerindeki hakkını ortadan kaldırır [8,14]. Kadınlarda fiziksel, sosyal ve zihinsel sorunlara yol açar. Hatta bu

muayene cinsel saldırıların kanıtlanamaması, bekaret olmaması kavramının ahlaksızlık anlamına gelmesi, yurtlardan, okullardan öğrencilerin muayeneye sevk edilmesi, intiharlar ve namus cinayetleri gibi sonuçlara da yol açmıştır [6,15,16]. Üniversite öğrencilerinin %54.5-85'i bile evlendiğinde bekaretin çok önemli olduğunu belirtmiştir. Bu durum bekaretin sosyal hayattaki benimsenmesinin çok yaygın olduğunun bir göstergesidir [15,16]. Bazı kadınlar hymen'in kaybedilmesinin ölüm gibi olduğunu vurgulamıştır. Bu açıklama kadınlar üzerinde oluşturulan baskı nedeniyle oluşan ciddi bir tahribatı göstermektedir [17]. Birçok kadın için ilk cinsel ilişki hymen'in patlayacağı korkusunu yaşama, kontrol edilemeyen ağrı, aşırı kanama korkusu veya bakire olup olmadığının test edilme korkusu anlamına gelir. Bu kadınlar "ilk" ve "özel" bir durumun sadece kadınlar için geçerli olduğunu bilir, çünkü toplumdaki baskınlığının doğal bir sonucu olarak kocası kendisi ile ilişkiye girmeden önce bir başkasıyla sevişmeyi istemiş veya denemiş olabilir [6]. Bazı kadınlar evlenmeden önce cinsel yakınlaşmalar yaşamak isteyebilir ve sonra da bir suçluluk duygusu yaşayabilir. Çünkü onlar bekaretlerini hymen ile koruduklarını ve artık kaybettiklerini düşünmektedirler. Ayrıca, bu kadınların bir kısmı evlenmek istedikleri zaman bekaretini ispatlamak zorunda hisseder ve onlar bekaret onarım müdahaleleri ile kendi bekaretlerini kazandıklarını düşünürler. Antik çağlardan başlayarak günümüze kadar hymen'in bekaretin ve dolayısıyla kadınların cinselliğinin denetim altına alınmasının önemli bir aracı olduğuna inanılmıştır. Hymen'in ilk cinsel ilişkide yırtılması gerektiği, kanama meydana gelmesi gerektiği ve bir kadının bekaretinin bu zar yapısı ile tespit edilebileceği düşünceleri yanlıştır. Bu nedenle ilk cinsel ilişki sırasında kanama bekaretin kanıtı değildir.

Yapısal Farklılıklar

Hymen çok farklı yapılarda olabilir (Şekil 1) [11,18-20].



Şekil 1. Hymen'in yapısal farklılıkları.

Tartışma

Hymen Muayenesi

Bakireliğin tıbben ispatı şeklindeki yanlış inanış nedeniyle bazı kadınların aileleri veya eşleri bu kadınlara hymen muayenesi yapılması talebinde bulunmaktadır. Bunun sonucunda da hymen muayeneleri, çoğu zaman kadının rızası dışında tıbbi muayenelerde uzun yıllardır kullanılmaktadır [6,13,14]. Kusurlu olma (kabahatli sayılma) kavramının kanunlardan çıkarılması sonucunda, cinsel saldırı için yapılacak muayenelerde tek ölçütün hymen olarak değerlendirilmesinin önüne geçilmiştir. Zaten bu muayenenin kadının rızası olmadan yapılması, kadının kendi vücudu üzerindeki hakkını ortadan kaldırması nedeniyle de uygun değildir [14]. Cinsel saldırı sonrasında başvuruda bulunan adli vakalar hariç, hymen muayenesi talepleri iade edilmeli ve genital muayene sonuçları rapor edilmemelidir. Bir kadının kendi iradesiyle hymen muayenesini talep etmesi durumunda hekim, sadece bir uzman ya da danışman konumundadır. Hekim sadece bilimsel bilgi verir (hymen'in çok farklı yapılarda olabileceğini belirtmek gibi). Eğer hekim bu muayeneyi yapmayı tercih ederse bu muayene ve kontrol için sadece bilimsel donanımları kullanmalıdır. Diğer bir ifadeyle, hekimler bu muayeneyi yapmayı tercih ederse kadınların ilk kez cinsel ilişkiye girip girmediğini denetlemek için bekçilik yapmak zorunda kalmakla bir tutulduğu düşünülebilir [14,21,22]. Sonuç olarak, hymen muayenesi, rutin olarak ya da sağlık sorunlarına bağlı olarak yapılan tıbbi muayenenin bir parçası değildir.

Hymenoplasty (Hymen Onarımı)

Bazı kadınlar evlenmeden önce cinsel yakınlaşmalar yaşayabilir. Sonrasında onlar bekaretlerini hymen ile koruduklarını ve artık kaybettiklerini düşünmeleri nedeniyle bir suçluluk duygusu yaşayabilir. Bu kadınlar evlenmek istedikleri zaman bekaretini ispatlamak zorunda hissederek bekaret onarım müdahaleleri ile kendi bekaretlerini yeniden kazandıklarını düşünürler. Böylece daha önceden hiç cinsel birleşme yaşamamış gibi görünmesine rağmen genç kadın, içinde suçluluk ve kandırma olan bir başlangıçla evliliğe kötü bir başlangıç yapar. Bu durumda özellikle kadın olmak üzere erkek için de olumsuz bir cinsel yaşam getireceği akla gelmektedir. Bazı hekimler hastasının bekaret onarımı talebi karşısında genç kadının bu durumundan yararlanıp çok yüksek bir ücret talep edebilmektedir [22].

Hekimin Etik Sorumlulukları

Hymen'e toplumsal anlam yüklenmesi nedeniyle kadınlar kendi iradeleriyle de hymen muayenesini veya bekaret onarımını talep edebilir. Bu durumda hekimin etik sorumlulukları, talebi konusunda kadının bilgilendirilmesi ve işlemi reddetmektir [11,14,22]. Sonuç olarak bu durumda dahi hekimler hymen muayenesi veya bekaret onarımı taleplerini reddetme hakkına sahip olduklarını unutmamalıdır. Ancak hymenoplasty ve vulvoplasty operasyonları sık olarak uygulanmaktadır. Birçok hekim hymen onarımı talep eden hastalara bu onarımı yapmaktadır. Bu tamir işleminin evlilikte kadının bakire olması gerekir inancına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Eğitim Programları Düzenlenmesi

Sonuç olarak, hymen'in detaylı yapısı, hymen muayenesi ile ortaya çıkabilecek sağlık ve psikososyal sorunlar gibi alanlarda toplum ve bireyler için eğitim programları düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Toplumun bilgilenecek bireylerin bu yanlış inanışın sonuçlarının farkına varacak olması sorunu en başından çözebilecektir.

Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı

Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.

Kaynaklar

1. Berenson A, Heger A, Andrews S. Appearance of the hymen in newborns. *Pediatrics* 1991;87:458.
2. Raveenthiran V. Surgery of the hymen: from myth to modernization. *Indian J Surg* 2009;71:224-6.
3. Emans SJ, Woods ER, Allred EN, Grace E. Hymenal findings in adolescent women: impact of tampon use and consensual sexual activity. *J Pediatr* 1994;125(1):153-60.
4. Ryan G. Childhoodsexuality: A decade of study. Part I: research and curriculum development. *Child Abuse Negl* 2000;24:33-48.
5. Basaran M, Usal D, Aydemir C. Hymen sparing surgery for imperforate hymen: case reports and review of literature. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2009;22(4):e61-e64.
6. Loeber O. Over het zwaard en de schede; bloedverlies en pijn bij de eerste coïtus. *Tijdschrift voor Seksuologie* 2008;32:129-37.
7. Vij K, editor. *Textbook of Forensic Medicine and Toxicology: Principles and Practice*. 5th ed. India: Elsevier; 2011. p. 314.
8. Loeber O. Wrestling with the hymen: Knowledge and attitudes. *Eur J Contracept Reprod Health Care* 2014;23:1-6.
9. Kimberly A, Mahaffy K. The gendering of adolescents' child bearing and educational plans: reciprocal effects and the influence of social context. *Sex Roles* 2002;46(11/12):403-17.
10. Atlı AK, Özvarış ŞB. Çalışma yaşamı ve kadın. *Sağlık ve Toplum* 1998;3-4:73-8.
11. Amy JJ. Certificates of virginity and reconstruction of the hymen. *Eur J Contracept Reprod Health Care* 2008;13(2):111-3.
12. Juth N, Lynöe N. Zero tolerance against patriarchal norms? A cross-sectional study of Swedish physicians' attitudes towards young females requesting virginity certificates or hymen restoration. *J Med Ethics* 2014 Feb; 26. doi: 10.1136/medethics-2013-101675.
13. Fidan D. Bekaret muayenesi uygulaması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası* 2005;430-3.
14. Raphael DD. Commentary: The ethical issue is deceit. *BMJ* 1998;316:460.
15. Dilbaz N, Erkmen H, Seber G, Kaptanoğlu C, Baysal B, Tekin D. Üniversite öğrencilerinin cinsellikle ilgili tutumları. *Ankara Tıp Dergisi* 1992;14:17-24.
16. Özcan S, Aras Ş, Şemin S, Orçin E. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri. *DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2004;18:27-39.
17. Şimşek H. Effects of Gender Inequalities on Women's Reproductive Health: The Case of Turkey. *DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2011;25(2):119-26.
18. Onderoğlu S, Aksit D, Onderoğlu LS. The configuration of prepubertal hymen in Turkish population and its clinical aspect. *Okajimas Folia Anat Jpn* 1993;70(1):35-9.
19. Edgardh K, Ormstad K. The adolescent hymen. *J Reprod Med* 2002;47(9):710-4.
20. Al Herbish AS. The hymen morphology in normal newborn Saudi girls. *Ann Saudi Med* 2001;21(3-4):188-9.
21. Rogers D. The genital examination. In: Dalton M, editör. *Forensic gynaecology - Towards better care for the victim of sexual assault*. London: RCOG Press; 2004. p. 140-1.
22. Kopelman LM. Make Her a Virgin Again: When Medical Disputes about Minors are Cultural Clashes. *Journal of Medicine and Philosophy* 2014;39:8-25.

How to cite this article:

Kılıç C, Kalay R, Kılıç E. Hymen and Be Blameworthy. *J Clin Anal Med* 2014;5(suppl 2): 253-5.